


I 75 I





D. O. M.
POSITIONES ANATOMICÆ
ET
CHIRURGICÆ.

EX ANATOMIA.



UAM dira sit cancri sævities, ab omnibus notum est. Et si vitium illud, quamlibet corporis partem, offendere possit; frequentius tamen mammas feminarum infestat. Quà propter, ad Chirurgicas positiones remissâ cancri mammarii curatione, pectoris externas partes hîc perlustrare juvat.

PARTIUM externarum pectoris, seu trunci partis collum inter & abdomen sitæ, diversa natura; aliæ ossæ, cartilagineæ; nonnullæ musculosæ; quædam vasculosæ, nervæ, glandulosæ; aliæ membranaceæ sunt, & adiposæ.

OSSIUM Thoracis ordo sic se habet: regionem anteriorem sternum & claviculæ, posteriorem vertebræ duodecim & scapulæ,

Tlatera occupant costæ in veras & spurias distinctæ. Costæ propriæ cartilagine adactæ, miram arcuato fornici ferè similem, sursum angustiores, deorsum verò ampliores, machinam efficiunt.

Duo pectorales muscoli, & serratus major, partim mammis subjacentes, oris costarum, intercostalibus ve musculis & aliis, diversimodè adhærent.

PECTORALIS majoris & latissimi dorsi humero insertiones cavitatem axillarem efformant; ubi à glandulis, pinguedine, & vasis huc & illuc serpentibus, plurima Chirurgo notanda veniunt.

MAMMAS, in anticâ thoracis regione sitas esse, neminem fugit; harum usum & molem tum à sexu, tum ab ætate, tum deniquè à vario feminarum statu, repetere necessarium est.

PRO diverso, in prægnantibus, puerperis & lactantibus, ac in maribus & infantibus, mammarum usu, ipsarum glandulæ ad conglobatas modò, modò ad conglomeratas revocandæ.

OB arteriæ mammariæ cum epigastricâ anastomosim, mirum uteri cum mammis fieri consensum, quidam existimarunt: exinde mulieres quinquaginta circiter annos natas, suppressis videlicet mensibus, cancro mammario magis obnoxias esse, nec immeritò putarunt.

DESCRIPTAS thoracis partes, communia velant tegumenta; ex quibus ad mammæ centrum efflorescit papilla, quam cingit areola.

EX CHIRURGIA.

CANCER, græcè *καρκινωμα*, tum ut tumor, tum ut ulcus spectari solet. Propriâ descriptione donatur quælibet canceri species.

CANCER tumor, est durus, inæqualis; quandoquè rotundus, calore & dolore lancinante molestus; circa plures, inflatæ serpunt & prominent venæ; in quibusdam verò delitescunt. Alba vel rubra, livida vel nigra cutis, pro variis depravationibus, remanet. Nonnunquam dolore, calore, pruritu & inflammatione ingravescentibus, ipsamet cutis, gangrænâ correpta, disrumpitur.

LACERATA cute, hiat ulcus foetidum, in ambitu subnigris turgescens venis: tenuis ac interdum facibus vini similis, manat sanies, quæ acrimoniâ suâ non cutem tantum, sed & subjectas partes, multo cum dolore, corrodit & quasi depascitur. Ex ulcere

subpallidæ carnes acervatim luxuriant. Inversis, retortisque marginibus, horridum aspectu se præbet cancer exulceratus.

CARCINOMATIS indoles cognitu difficilis: de illâ valdè inter se dissentiunt authores. Nonnulli, à vermiculis carnes depascentibus; multi, malo lienis & jecoris habitu; alii verò, peculiari quodam vitio, carcinoma procreatum judicavere.

CANCRI causa duplex; proxima, & remota. Retentio in mammis humore, unius glandulæ, aut plurium glandularum vasa minima mox ingurgitantur. Concescente humore, obturantur quoque vasa majora: hinc circuitus liquorum in vicinis partibus impeditur: en causa proxima.

QUÆ, aut limpham spissare, aut vasorum tunicas deprimerè & vellicare possunt, ictus, punctiones, lapsus, compressiones, suppressi menses, quandoquè hæmorrhoides, indebita victûs ratio; peculiare vitium, scilicet venereum, scrophulosum, scorbuticum, &c deniquè acria quævis sanguinis massam labefactantia, remotas inter causas annumerantur.

EX allatis descriptionibus, genuina patent cancerorum signa.

A carcinomatis causâ, situ, vetustate, gradu, & totius ægræ corporis habitu, prognosis habenda.

CUR multos per annos in eodem incrementi statu permaneat tumor; cur verò paucos intra menses, paucos-ve quandoquè dies ultramodùm adaugeatur; quænam exindè deduci debeant animadversiones; in motu fluidorum inquiratur argumentum.

TUTIUS citiùs ve scalpello sanari cancos, ratio comprobant & experimenta. Si quis mali principiis obstare tentaverit, à medicamentis calefacientibus, & adurentibus, sese abstineat.

QUOD ad operationem spectat: acus veterum, forcipes, furcas, & alia hujusce generis rejicienda censemus.

CUM de cancro exiguo & undiquè vacillante agitur, ægrâ ritè præparatâ & collocatâ, nunc perpendiculariter, nunc cruciatim, sola cutis rescindatur: deindè digitorum ope, apprehenso & sublevato tumore, textu cellulari hic & illuc resecto, tumoris fiat extractio; & sic de cæteris tumoribus, si qui sint aut infra musculos, aut ad axillas usque, ne remaneat cancri-redivivi germen.

CARCINOMATIS majoris, etiam exulcerati, corripitur manu mole: tunc cutis ita circulariter secetur, ut tota deinceps aufertur cancri massa.

POST cancri amputationem, hæmorrhagiæ rarò metus: si ta-

men nimium accidat sanguinis effluvium, mox arte sistatur. Quis-
dam astringentibus; quidam ligaturâ coercuere; sed ut plurimum
sola valet compressio.

ULCERE ablato vel tumore, plaga ut decet deligetur; dein
venæ sectiones, & alia artis auxilia, quantum opus erit, adhi-
beantur.

Si difficile ad cicatricem ducatur plaga; vel, jam obductâ
cicatrice, de novo hiascat ulcus fœdum; aut nobiliori parti aliquod
immineat periculum; tunc laudatur foniculus.

Quæ tandem immedicabili cancro laborant, ad curationem
palliativam confugiant; ideò jugi diætâ, potissimum lacteâ, & to-
pici lenientibus: salutis suæ consulant.

de Clermont
Has positiones, DEO JUVANTE, & præside M. JOANNE-
ANTONIO SILVY, Artium & Chirurgiæ Magistro,
tueri conabitur ANTONIUS TUSSANUS AMY Claro-
montensis, in almâ universitate Parisiensi Artium Magister.

P A R I S I I S,
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

Die Sabati 16^a. Januarii à sesqui-secundâ post meridiem
ad septimam. Anno Domini 1751.

P R O A C T U P U B L I C O.

Typis DELAGUTTE Regiæ Chirurg. Academiæ
Typographi 1751.